MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA. ESTUDIO DE UN CASO DE MELANOMA ACRAL LENTIGIOSO (MAL) TRATADO SÓLO CON LA VACUNA CIMT-54

Dr. Hugo Segura Puello

Resumen

El melanoma lentiginoso acral es uno de los tipos de melanoma poco frecuentes, pero igualmente agresivo a los demás tipos de melanomas, con una supervivencia limitada entre 3 y 6 meses, por lo agresivo del tumor, de acuerdo al estadio en que se diagnostique.

El melanoma es uno de los cánceres más agresivos y de muy mal pronóstico en relación a otros tipos de cáncer que son más lentos en su crecimiento e invasión.

Ingresa al estudio con la vacuna CMT-54 una paciente de 69 años con diagnóstico por biopsia de melanoma lentiginoso acral en fase de crecimiento horizontal sin invasión perineural, ni vascular, ni linfática. La paciente no acepta el tratamiento propuesto por cirujano oncólogo de amputación de su falange del primer metatarsiano del miembro inferior izquierdo, con posibilidad de amputación del miembro inferior izquierdo hasta la rodilla, por el mal pronóstico que tienen estos tipos de cáncer; ella rechaza rotundamente el tratamiento quirúrgico y decide formar parte de la investigación clínica con la vacuna Biológica CIMT-54, sin iniciar ningún otro tratamiento. La paciente, luego de firmar el consentimiento informado en forma voluntaria, inicia su esquema de vacunación según el protocolo, el día 3 de octubre del 2007 y durante un año se le aplican 10 dosis de la vacuna hasta el mes de septiembre del 2008; luego queda en control y observación durante 10 meses, tiempo en el cual no se observó progresión del cáncer, sino que por el contrario, la lesión involucionó y la paciente, tras de 36 meses de observación y tratamiento, presenta calidad de vida, con un índice de Karnofsky (IK) del 100%, sin ningún síntoma de progresión de la enfermedad y con supervivencia, aunque por parte de la medicina alopática le habían pronosticado menos de 6 meses de vida.

Por tanto podemos inferir que la vacuna por sí sola fue eficaz y produjo un efecto de regresión de la lesión tumoral en este tipo de cáncer que es muy agresivo, bloqueando la progresión a la metástasis.

De otra parte, la vacuna CIMT-54 resultó segura para la paciente, al no presentar ningún efecto secundario por la aplicación de esta; además la paciente presenta calidad de vida 36 meses después del único tratamiento recibido.

Este es el segundo caso de melanoma maligno en estadio II tratado solo con la vacuna que ha dado calidad de vida y supervivencia a los pacientes, por lo tanto la vacuna en este tipo de cáncer puede ser una nueva alternativa de tratamiento para este tipo de cáncer.

Palabras clave

Melanoma Lentiginoso; Cáncer; Inmunoterapia; Vacunas.

Hugo Segura Puello, religioso Agustino, es médico-cirujano general, con postgrado en investigación por la Universidad Manuela Beltrán de Colombia (UMB), de la que es docente. Está especializado en la investigación del cáncer en la UMB y ha escrito numerosos libros. También es Filósofo y Teólogo PUJ.